

服用抗生素

Taking Antibiotics

抗生素是对抗细菌感染的强大药物。如果使用得当, 抗生素可以通过杀死细菌或防止细菌繁殖来挽救生命。然而, 重要的是! 应只服用由医生开出的抗生素。

为什么你应该只服用医生开的抗生素?

我们最近从性工作者那里听说, 他们正在从不同的地方获得抗生素, 并服用这些抗生素, 来预防或治疗衣原体和淋病等常见的性传播感染。

然而如果这些感染得不到适当治疗, 就会引起长期的问题, 例如: 盆腔炎 (PID) 的严重感染, 这可能导致疼痛和输卵管的受损与阻塞, 再加上未来怀孕的问题。疼痛或分泌物等症状, 并不总是由淋病或衣原体引起的。他们可能有其他原因需要调查。

每一次感染, 都需要一种特殊的抗生素, 作有效的治疗。

服用错误的抗生素是行不通的。你不能确定你从朋友、互联网或你所在国家的商店得到的抗生素是否正确。

我们不建议你乱服用抗生素来防止性传播感染。因服用不必要的抗生素, 可能会导致健康问题, 或影响其他药物效

果, 需照医生指示定时定量的服用。

如果你服用了错误的抗生素, 一些细菌可能会存活下来, 治疗难度会更大。这意味着抗生素下次可能根本没作用。

你需要在你的性健康诊所, 或你的医生那

里对衣原体、淋病和其他性传播感染, 进行适当的检测和治疗。如果你有尿路感染的症状, 如排尿疼痛, 你也应该去看医生。

如果你没有得到适当的治疗, 你可能会把你的感染传染给客户或你的伴侣。性健康诊所的检测和治疗是免费和保密的。你不需要医保卡。我们可以为您提供翻译服务。

联系方式

电子邮件: swopconnect@swop.org.au

电话: (02) 9206 2166

免费: 1800 622 902 (悉尼城外, 新南威尔士州内)

可使用免费、保密和不带主观论断的性卫生服务, 不需出示医保卡。

新州卫生部 – 性健康资讯热线:

1800 451 624 (工作日上午9时至下午5时30分)

如果您需要口译员协助, 请拨打翻译与传译服务电话 131 450 (按本地电话收费), 要求接通性健康资讯热线: 1800 451 624